

●スタレボ(ノバルティス)

レボドパカルビドパエンタカボン

配合錠:L50 50mg 5mg 100mg

配合錠:L100 100mg 10mg 100mg

【効】レボドパ・カルビドパ配合錠で

日内変動(wearing-off現象)がある場合.

【用】配合錠L50,配合錠L100を

組み合わせて1回1~2錠.

症状により量及び回数を調節.

最大:1回2錠まで.

1日8回まで.

レボドパとして1日総量1500mg.

A1. 3剤併用からの切替は

レボドパ,エンタカボンの1回量は

変更しない.

本剤2錠へ切替の場合は

レボドパ量は変更しない

A2. レボドパ・カルビドパから

エンタカボン追加時

・1回レボドパ量は変更せず,

切替は必ず本剤1回1錠とする.

・レボドパ濃度上昇で副作用(ジスキ

ネジー等)に注意

→用量調節又は切替え前に戻す.

B.本剤投与中:

・必要時は1回用量を調節.

投与間隔や回数の変更,必要に応じ

レボドパとエンタカボンの

追加・併用による調節も考慮.

・レボドパ追加時も

レボドパ1日総量は1,500mgまで.

・1回2錠(エンタカボン量200mg)は

→ジスキネジー等に注意,減量も考慮.

特に40kg未満は注意.

・肝障害→1回2錠は注意.

C.本剤から→レボドパ・カルビドパへ

切替時,必要に応じレボドパ増量.

【体内動態】3剤夫々の動態を参照.

【禁,慎,注意,併,副】→■頁.