

ビマトプロスト Bimatoprost

●**グラッシュェビスタ**(アラガン)

外用液剤：0.03%,アプリーケータ140本

ベンザルコニウム添加.

[特] プロスタグランジン誘導体.

高眼圧治療薬として開発中に発見.

[患] 1.適用法は添付文書参照.

2.虹彩色素過剰を患者へ事前に説明,
中止後も消失しない.

定期的診察→継続の可否を検討.

3.しみる,そう痒感,眼痛等の持続
→眼科医へ受診を指導.

4.眼疾患又は眼手術後で治療中は
眼科医に相談.

5.上眼瞼辺縁部以外への付着時は,
よくふき取るか洗い流す.

6.塗布15分以上後にコンタクトレンズ
装用(ベンザルコニウムによる変色)

[効]特発性及び抗癌薬で睫毛負毛症

[用]1日1回就寝前に,

片眼毎に1滴をアプリーケータに滴下し,
上眼瞼辺縁部の睫毛基部に塗布.

抗癌薬の場合:

投与終了4週後以降に開始.

[禁] a.小児.

b.妊婦, c.授乳中.

d.下眼瞼へ使用しない,

e.点眼しない.

[慎]無水晶体眼,眼内レンズ挿入眼

又は硝子体手術等の既往:

→黄斑,浮腫,→視力低下

[注]発毛可能な毛包が無い場合,無効.

[併]B.慎:プロスタグランジン系点眼
剤(ラタノプロスト)の眼圧低下が減弱

[副]16%)A.重大:a.虹彩色素過剰

b.眼瞼溝深化

D.●結膜充血10%,眼脂,眼乾燥,点状角
膜炎,眼瞼紅斑,眼瞼~眼そう痒,眼瞼刺
激,眼刺激,結膜濾胞,眼瞼障害,睫毛乱
生,眼瞼炎,眼痛,眼瞼痛,眼部腫脹,眼瞼
浮腫,流涙増,霧視,皮膚色素過剰,毛髪
成長異常,灼熱感(眼瞼),眼窩周囲紅斑,
睫毛の裂毛,眼瞼及び眼窩周囲に斑状
発疹,紅斑性発疹,そう痒性発疹,皮膚
変色(眼窩周囲),顔面痛,麦粒腫,毛質異
常,睫毛眉毛脱落,頭痛,局所的アレルギー.